

GASTROSCOPIA IN SEDAZIONE (ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA)

PREPARAZIONE

- Per l'esecuzione degli esami endoscopici è necessario il **diguno assoluto da almeno 6 ore**, durante le quali non dovranno essere assunti **neanche i liquidi**.
- La sera precedente l'esame consumare una **cena leggera**.

Se l'esame dovrà essere eseguito nel pomeriggio, si potrà consumare la colazione, con tè e fette biscottate/biscotti.

- In caso di assunzione di terapia:
 - Aspirina - l'assunzione non dovrà essere sospesa;
 - Antiaggreganti (tiklid, cardirene, ibustrin, plavix, brilique, efient) - l'assunzione dovrà essere sospesa 7 giorni prima dello svolgimento dell'esame;
 - Anticoagulanti orali definiti tao (sintrom, coumadin) - l'assunzione dovrà essere sospesa 5 giorni prima dello svolgimento dell'esame;
 - Nuovi anticoagulanti orali (pradaxa, xarelto, eliquis, lixiana) - l'assunzione dovrà essere sospesa 2 giorni prima dello svolgimento dell'esame.

La preghiamo di rivolgersi al cardiologo/angiologo che le ha prescritto la terapia antiaggregante/anticoagulante, o al centro tao che la segue, per comunicare la necessità di sospensione della terapia e la valutazione della eventuale somministrazione di eparina sottocute.

- La somministrazione di sedativi durante lo svolgimento degli esami endoscopici provoca sonnolenza, pertanto il **paziente dovrà essere accompagnato**; diversamente l'esame non potrà essere svolto in sedazione profonda.
- Nelle **12 ore successive** allo svolgimento dell'esame, il paziente non potrà guidare veicoli di alcun tipo ed eseguire attività che comportino prontezza di riflessi.

In caso di impossibilità ad eseguire l'esame annullare la prenotazione con preavviso di almeno 72 ore.