



UREA BREATH TEST

PREPARAZIONE

- ❖ NELLE 4 SETTIMANE PRECEDENTI L'ESAME IL PAZIENTE NON DEVE ASSUMERE I SEGUENTI FARMACI:
 - ANTIBIOTICI
 - INIBITORI DI POMPA PROTONICA (MEPRAL, ANTRO, OMEPRAZEN, LOSEC, LIMPIDEX, LANSOX, PANTORC, PEPTAZOL, PANTECTA, AXAGON, NEXIUM, ESOPRAL, LUCEN)
 - H2 ANTAGONISTI A DOSE PIENA (RANIDIL 300, ZANTAC 300, RANIBEN 300, ULCEX 300, GASTRIN 40, FAMODIL 40, MOTIAX 40, GASTRALGIL 150, NIZAX 300)
 - RANITIDINA DISMUTATA (PYLORID, ELICODIL)

- ❖ NELLA SETTIMANA PRECEDENTE L'ESAME IL PAZIENTE NON DEVE ASSUMERE I SEGUENTI FARMACI:
 - H2 ANTAGONISTI A METÀ DOSE (RANIDIL 150, ZANTAC 150 ETC ... VEDI SOPRA)
 - SUCRALFATO (SUCRALFIN, SUCRAMAL, GASTROGEL, CITOGEL, ANTEPSIN)

- ❖ IL GIORNO DELL'ESAME IL PAZIENTE DEVE:
 - ESSERE DIGIUNO DA 8 ORE
 - NON FUMARE DALLA SERA PRECEDENTE
 - LA MATTINA DELL'ESAME ESEGUIRE SCIACQUI CON IL COLLUTTORIO



❖ NEI GIORNI PRECEDENTI LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME E' CONSENTITA, OVE NECESSARIO, L'ASSUNZIONE DEI SEGUENTI FARMACI:

- PROCINETICI (PLASIL, PERIDON, MOTILIUM, MOTILEX, LEVOPRAID, LEVOBREN)
- ANTIACIDI (MAALOX, RIOPAN, GLIPTIDE, GAVISCON E GAVISCON ADVANCED)